EW NUTRITION · GLOBIGEN · PRASAD

Globigen jajna protutijela za prasad

Imunoglobulini iz žumanjka (IgY) koji u crijevu vežu uzročnike proljeva: Pig Doser u usta u prvim danima života, Jump Start u hrani prije i poslije odbića.

PIG DOSER	JUMP START	UMJESTO PLAZME	DJELUJE
4 + 2 ml	1–2 kg / t	20–40 kg / t	U crijevu

DVA PROIZVODA
jedno načelo



Pig Doser
GLOBIGEN · TEKUĆI, U USTA

Tekući starter s jajnim imunoglobulinima (IgY), probiotikom *Enterococcus faecium*, sojinim uljem i vitaminima A, D i E. Daje se svakom praščiću dozatorom, u prvim danima života.

DOZA	4 ml 1. dan, 2 ml 3. dan
PAKIRANJE	250 ml i 500 ml, s dozatorom



Jump Start
GLOBIGEN · PRAH, U HRANI

Koncentrirani izvor jajnih imunoglobulina (IgY) za hranu prasadi, prije i poslije odbića. U pokusima EW-a zamjenjuje krvnu plazmu u prestarteru.

DOZA	1–2 kg na tonu hrane
UMJESTO	20–40 kg/t krvne plazme

ZAŠTO
IgY

Praščić se rađa bez vlastitih protutijela. Zaštitu iz kolostruma s vremenom gubi, a vlastiti imunitet sazrijeva tek nakon odbića. Između toga je razdoblje kad je prasad najranjivija.

Jajni imunoglobulini (IgY) nastaju kad se kokoši imuniziraju protiv uzročnika proljeva prasadi: E. coli (K88, K99, 987P, F18), klostridija, rotavirusa. U crijevu prasadi IgY vežu te uzročnike i izbacuju ih izmetom prije nego što se prihvate za stijenku crijeva. Djeluju samo u crijevu i ne miješaju se u vlastiti imunitet praščića.

PRIMJENA
u prasilištu i uzgoju

KADA	PROIZVOD	KAKO	DOZA
1. dan	Pig Doser	u usta, dozatorom unutar prva 24 sata života	4 ml po prasetu
3. dan	Pig Doser	u usta, dozatorom ili 2 ml 2. dan i 2 ml 3. dan	2 ml po prasetu
prije odbića	Jump Start	u hrani za prasad na sisi	2 kg/t
2 tjedna nakon odbića	Jump Start	u prvoj hrani nakon odbića	2 kg/t
dalje u uzgoju	Jump Start	u drugoj hrani nakon odbića	1 kg/t

Detaljan raspored po danima i potrebne količine nalaze se u dokumentu „Program primjene — Globigen Pig Doser i Jump Start".

REZULTATI
pokusa EW-a

POKUS	USPOREDBA	POKAZATELJ	KONTROLA	GLOBIGEN
Filipini 270 prasadi, 28.–70. dan	bez dodatka / Jump Start 2 kg/t	Smrtnost	7,5 %	**1,3 %**
		Učestalost proljeva	11,1 %	**6,7 %**
		Prirast u razdoblju	16,1 kg	**20,6 kg**
		Konverzija hrane	1,96	**1,47**
Francuska 314 prasadi nakon odbića	plazma 20 kg/t / Jump Start 2 kg/t	Smrtnost	5,7 %	**1,3 %**
		Dnevni prirast	182 g	**192 g**
Njemačka 96 krmača, 1 551 prase	bez dodatka / Pig Doser	Manja smrtnost u prasilištu i više odbijene prasadi po krmači godišnje, uz obje sheme doziranja		

Izvor: EW Nutrition, prezentacija Globigen (Tarragona 2026.) i stručni članak o primjeni jajnih protutijela kod prasadi. U pokusu na Filipinima sve su skupine imale i antibiotik u hrani.

KORIST
za farmu

Manje proljeva i uginuća
IgY vežu E. coli, klostridije i rotaviruse u crijevu, u razdoblju kad prase nema dovoljno vlastitih protutijela.

Bolji prirast nakon odbića
Zdravije crijevo znači bolje iskorištavanje hrane u najosjetljivijem dijelu uzgoja.

Zamjena za krvnu plazmu
1–2 kg/t Jump Starta umjesto 20–40 kg/t plazme oslobađa mjesto u recepturi prestartera.

Jednostavna primjena
Pig Doser dolazi s dozatorom, a Jump Start se umiješa u hranu kao i ostali dodaci.

DISTRIBUCIJA
i kontakt

need 4 feed d.o.o.
Šubićeva 20, 10 000 Zagreb
OIB 79018988192
need4feed.hr

Lovro Rubčić — Prodaja
+385 91 619 2863
lovro@need4feed.hr

Teo Vilendečić — Prodaja
099 66 77 242
info@need4feed.hr

Podaci su informativni i ne predstavljaju jamstvo. Koristiti prema uputama proizvođača.